



# MÖGLICHE PROFILE FÜR DIE ERSTDIAGNOSTIK

Hinweis: Die klinischen Angaben der 1. Seite sind auch für die Befundung der Profile wichtig

## Kinderwunsch / Hormoncheck

### Kontrolle Follikelphase

Hinweis: Blutabnahme zwischen 3. und 5. ZT

- LH
- FSH
- Östradiol (E2)

### Kontrolle Lutealphase

Hinweis: Blutabnahme ca. 21. Zyklustag bei 28-30-tägigem Menstruationsintervall

- Progesteron
- Östradiol (E2)

### Zyklusstörung / Amenorrhoe

Hinweis: falls Zyklus vorhanden, Blutabnahme zw. 3. und 5. ZT, sonst jederzeit möglich

- FSH
- LH
- Prolaktin
- Östradiol (E2)
- TSH
- Testosteron
- DHEA-S
- SHBG

## Hyperandrogenämie

### PCO-Syndrom

Hinweis: Blutabnahme zw. 3. und 5. ZT (wenn vorhanden), nüchtern

- FSH
- LH
- Prolaktin
- Testosteron
- TSH
- Cortisol
- DHEA-S
- Insulin
- SHBG
- Glukose (NaF-Blut)

### Androgenisierung

Hinweis: Blutabnahme jederzeit

- Testosteron
- SHBG
- DHEA-S

### Adrenogenitales Syndrom (AGS)

Hinweis: Blutabnahme zw. 3. und 5. ZT zw. 8:00 und 9:00 Uhr morgens

- 17-OH-Progesteron
- DHEA-S
- Cortisol
- Aldosteron
- Testosteron
- SHBG

## Menopause/ Ovarstimulation / Haarausfall

### Peri-/Postmenopause

Hinweis: Blutabnahme zw. 3. und 5. ZT

- FSH
- Östradiol (E2)

### Status Ovarstimulation

Hinweis: Blutabnahme jederzeit

- LH
- Östradiol (E2)

### Haarausfall / Alopezie

Hinweis: Blutabnahme jederzeit

- Testosteron
- DHEA-S
- Ferritin
- Zink
- TSH
- SHBG
- Biotin (Vitamin H)

## Verschiedene endokrinologische Profile

### Habituellem Abort

Hinweis: Blutabnahme jederzeit

- TPO-AK
- Lupus-Anticoagulans
- Thrombophilie-Screening
- TSH
- Anticardiolipin-Antikörper

### Adipositas

Hinweis: Blutabnahme nüchtern, morgens zw. 8:00 und 9:00 Uhr

- Testosteron
- Cortisol
- Insulin
- TSH
- DHEA-S
- Glukose (NaF-Blut)

### Hypercortisolismus

Hinweis: Blutabnahme zw. 3. und 5. ZT, Cortisol-Abnahme: morgens zw. 8:00 und 9:00 Uhr nachmittags zw. 16:00 und

- Testosteron
- Cortisol (morgens)
- DHEA-S
- 17-OH-Progesteron
- Cortisol (nachmittags)

### Schilddrüsenfunktion

Hinweis: Blutabnahme jederzeit

- TSH
- ft3
- ft4

### Insulinresistenz

Hinweis: Blutabnahme nüchtern, morgens zw. 8:00 und 9:00 Uhr

- HOMA-IR
- Insulin
- Nüchternglukose

### Status ovarielle Kapazität

Hinweis: Blutabnahme jederzeit

- Anti-Müller-Hormon (AMH)

## Anforderung von einzelnen Laborwerten

- 17-Hydroxy-Progesteron
- Aldosteron
- AMH
- Androstendion
- Cortisol
- DHEA-Sulfat
- DHEA
- Freies Thyroxin (ft4)
- Freies Trijodthyronin (ft3)
- FSH
- HCG
- LH
- Östradiol (E2)
- Prolaktin
- Progesteron
- SHBG
- Thyreoglobulin-Antikörper (Tg-AK)
- Thyreotropin Rezeptor-Antikörper (TRAK)
- Thyreo-Peroxydase Antikörper (TPO-AK)
- Testosteron
- TSH

## Welchen Befund-Typ wünschen Sie?

- ENDO KLASSIK  
Nur Laborwerte
- ENDO THERAPIE  
zusätzlich: Therapieoptionen
- ENDO PLUS  
Differentialdiagnosen, nächste Schritte, klinische Fragestellungen
- ENDO WISSEN  
zusätzlich: fallbezogene Kurz-Fortbildung